

# V V ZAŠČITIMO SE PRED

# klopi

## POP protokol - PREVENTIVA, OBLEKA, PREGLED

### Po prihodu iz gozda:

- SE PREOBLIČEMO
- OTROKA PREGLEDAMO, tudi predel lasišča
- OBLEKO OPEREMO pred ponovno uporabo
- ZVEČER OTROKA PONOVO PREGLEDAMO

### Dejstva:

- Klopni meningoencefalitis: **okužen je 1 odstotek populacije** klopov, oziroma po raziskavah (Durmiši 2006) le 0,6 % populacije. Klop, ki je okužen z virusom klopne meningoencefalitisa, prenese okužbo praktično takoj, ko se prisesa.
- Delež klopov, ki prenašajo **boreliozo je dosti večji, v posameznih predelih tudi do 50 odstoten. Če klopa okuženega z lymsko boreliozo odstranimo v 12 urah, možnosti za okužbo praktično ni.** Zato je pomembna preventiva.
- **Veliko okužb poteka brez značilnih simptomov in težav**, kar pomeni, da ljudje boleznijo prebolijo, ne da bi vedeli, da so preboleli klopni meningitis ali boreliozo. Pri klopnem meningitisu na ta način poteka kar 75 do 98 odstotkov okužb, pri boreliozu pa približno 50 odstotkov okužb.
- Naj vas klopi ne odvrnejo od igre in učenja v naravi, saj so njene koristi za otroka nedvomno velike.

